

OCCUPE
TOI
DU RADON

STE-BARBE, QC

Défi de 100 trousse de dépistage de radon

41
habitations

ont participé en effectuant des mesures de radon au cours de l'hiver 2024-2025 à l'aide de dosimètres Alpha Track de 91 jours. Cela représente environ de 7 % des habitations de la communauté.

2 %

des habitations ont mesuré au-dessus de la ligne directrice de Santé Canada de 200 Bq/m³.

🏠 Moins de 100 Bq/m³ (71 %)

🏠 100-200 Bq/m³ (27 %)

🏠 Plus de 200 Bq/m³ (2 %)



Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui provient du sol.



L'exposition à des concentrations élevées de radon entraîne un risque accru de développer un cancer du poumon.

Les concentrations peuvent varier entre les maisons voisines. **La seule façon de connaître la concentration de radon est de la mesurer.**

Le radon s'infiltre dans les maisons par le contact avec le sol et peut atteindre des concentrations élevées.



Lorsque vous recevez le rapport,

prenez connaissance de la concentration de radon qui a été mesurée afin de pouvoir prendre une décision quant à la suite des choses.

La concentration de radon sera indiquée en Bq/m³. Il s'agit d'une mesure de radioactivité, car **le radon est un gaz radioactif**.



Si la concentration de radon mesurée est **de moins de 200 Bq/m³, elle est conforme aux lignes directrices canadiennes**.

Envisagez de refaire un test dans 5 ans.



RÉDUISEZ LA CONCENTRATION :

Lorsque la concentration de radon mesurée **est égale ou supérieure à 200 Bq/m³**, prenez des mesures pour la **RÉDUIRE** au cours de l'année suivant la mesure.

La norme canadienne quant à la concentration maximale de radon dans l'air intérieur est de 200 Bq/m³.

Si vous avez effectué un dépistage dans votre maison et que la concentration de radon est égale ou supérieure à la ligne directrice canadienne de 200 Bq/m³, Santé Canada vous recommande de prendre des mesures pour la réduire.

Plus la concentration est élevée, plus les mesures d'atténuation doivent être prises rapidement pour la réduire au plus bas niveau possible. Bien que le risque pour la santé lié à une exposition à une concentration de radon inférieure à la directive canadienne soit faible, il n'existe pas de concentration qui soit considérée comme étant sans risque.

Il en revient à chaque propriétaire de maison de déterminer la concentration de radon qu'il est prêt à accepter.


CONCENTRATION DE RADON	RISQUE À VIE DE DÉVELOPPER UN CANCER DU POUMON	RISQUE À VIE DE DÉVELOPPER UN CANCER DU POUMON SI VOUS FUMEZ
Moins de 100 Bq/m ³	1 %	12 %
100-199 Bq/m ³	1,5 %	15 %
200-599 Bq/m ³	2 %	17 %
600 Bq/m ³ et plus	4 %	26 %

Vous avez testé votre maison ; encouragez maintenant vos amis et votre famille à faire de même ! Les fournisseurs de détecteurs de radon peuvent être trouvés en ligne : takeactiononradon.ca/fr/depistage/commander-trousse-depistage-radon



Vous devez réduire la concentration de radon chez vous ?

Vous pourriez avoir droit à certains programmes de soutien financier pour vous aider. Pour plus d'informations au sujet des subventions et des garanties en matière de radon, visitez notre site Web : takeactiononradon.ca/fr/protéger



Système d'atténuation du radon

Un système d'atténuation du radon est la méthode la plus efficace pour réduire les concentrations de radon. Les recherches montrent que **les professionnels certifiés du radon** sont en mesure de réduire les concentrations par plus de 90 %. D'autres mesures, comme l'optimisation de la ventilation et le colmatage des fissures, peuvent être bénéfiques à court terme, mais sont moins efficaces.

COMMENT TROUVER UN PROFESSIONNEL CERTIFIÉ

takeactiononradon.ca/fr/protéger/find-a-radon-mitigation-professional

Les professionnels certifiés de l'atténuation du radon sont formés pour évaluer adéquatement votre maison et concevoir des systèmes qui permettront de réduire efficacement la concentration de radon dans votre maison.

Les nouvelles maisons

Pour ceux qui construisent de nouvelles maisons, la norme CAN/CGSB-149.11-2019 de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) fournit des recommandations techniques et décrit les meilleures pratiques en matière de mesures de contrôle du radon dans les nouvelles habitations résidentielles basses.

Pour en savoir plus sur la réduction du radon :

Le Programme national de compétence sur le radon au Canada possède une liste de professionnels certifiés qui pourront vous aider à réduire la concentration de radon dans votre maison.

Pour en savoir plus sur la réduction du radon, visitez le : c-nrpp.ca/fr/trouvez-un-professionnel



Pour obtenir de l'information auprès de Santé Canada, y compris le Guide de réduction du radon pour les Canadiens, visitez le : www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/radiation/radon-guide-reduction-canadiens-sante-canada.html





Le Défi 100 trousse de dépistage de radon :

« Valoriser les communautés, sauver des vies »
Ste-Barbe



Canadian
Cancer
Society





Aperçu du projet :

- Le programme du *Défi 100 trousse de dépistage de radon* fournit 100 trousse de dépistage gratuitement aux communautés participantes à distribuer à leurs citoyens.
- C'est un « programme clé en main » avec des outils et des ressources disponibles pour chaque étape du processus.
- Aucun coût pour les communautés participantes: Il ne nécessite que le temps du personnel pour organiser, distribuer et récupérer les trousse de dépistage.



Les objectifs du programme

1) Distribuer des trousse de dépistage de radon aux communautés où il existe un risque de concentration élevée de radon et où le dépistage a été limité jusqu'à présent.

- *100 trousse de dépistage distribuées au cours de 100 jours*

2) Sensibiliser les populations locales au radon

- *les membres de la communauté avec un rapport personnel*

- *les champions communautaires reçoivent un rapport sommaire*



3) Générer des données dans les régions urbaines et rurales du pays qui n'ont pas été suffisamment dépistées.

4) Inspirer les programmes de radon existants dans les communautés participantes.



Résultats à ce jour


8 ans

200 communautés

- *11 provinces/territoires*
- *8 Premières Nations*
- *2 groupes Métis*

Plus de

30 000 troussees distribuées



Statistiques sur les participants de la communauté

eurofins Eurofins Radon Testing Sweden AB
Box 63
971 03 LULEÅ
SWEDEN

Site Web : radon.eurofins.se/en-sv/ # PNCR-C : CAL-202502

Rapport sur l'évaluation du radon

Date du rapport : «Report_Issue_Date»

Coordonnées du client : Adresse du site :
«First_Name» «Last_Name» «Testing_Address»
«Mailing_Address» «City/Town», «Province», «Postal Code»
«Emails» Emplacement de l'appareil
«Device_Location»

Appareil utilisé : **AlphaTrack**
Approuvé par PNCR-C - Plan d'assurance qualité en place.

No de série du détecteur	Appareil utilisé	Date de début de la mesure (mm/j/aa)	Date de fin de la mesure (mm/j/aa)	Durée de l'évaluation (heures)	Résultat (Bq/m³)
«Detector_SN»	AlphaTrack	«Test_Start_Date»	«Test_End_Date»	«Test_Duration»	«Test_Result_Bq_m3»

Résultats du laboratoire autorisés : <<Supersat. 0.0000>>
Marge d'erreur de <<Margin of error>>
Le symbole "<< >>" signifie "inférieur à". Cela indique qu'il n'a pas été détecté au niveau indiqué ci-dessus.

Les recommandations :
«Additional_information_about_your_samples»
«Recommendations»

Vous pouvez trouver un professionnel en atténuation du PNCR-C pour vous aider
[ici https://takeactiononradon.ca/fr/protages/trad-a-radon-mitigation-professional/](https://takeactiononradon.ca/fr/protages/trad-a-radon-mitigation-professional/)

Besoin d'aide pour interpréter ce rapport ? Vous pouvez trouver des informations en ligne
: <https://takeactiononradon.ca/fr/deptage/comprendre-les-resultats-de-votre-mesure-de-radon/>

Comprendre les RÉSULTATS DE VOTRE TEST DE MESURE DU RADON

Lorsque vous recevez le rapport, prenez connaissance de la concentration de radon qui a été mesurée afin de pouvoir prendre une décision quant à la suite des choses. La concentration de radon est indiquée en Bq/m³. Il s'agit d'une mesure de radioactivité, car le radon est un gaz radioactif.

Si la concentration de radon mesurée est inférieure à 200 Bq/m³, elle est considérée comme sûre. Lorsque la concentration de radon mesurée est supérieure à 200 Bq/m³, prenez des mesures pour la réduire à 200 Bq/m³ ou moins.

La norme canadienne quant à la concentration maximale de radon dans l'air intérieur est de 200 Bq/m³.

Si vous avez effectué un dépistage dans votre maison et que la concentration de radon est égale ou supérieure à la limite directive canadienne de 200 Bq/m³, Santé Canada vous recommande de prendre des mesures pour le réduire.

Puisque la concentration est élevée, plus les mesures d'atténuation doivent être prises rapidement pour la réduire au plus bas niveau possible. Bien que le risque pour la santé lié à une exposition à une concentration de radon inférieure à la directive canadienne soit faible, il s'agit pas de concentration qui soit considérée comme étant sans risque. Il est conseillé à chaque propriétaire de maisons de déterminer la concentration de radon qu'il est prêt à accepter.

CONCENTRATION DE RADON	RISQUE À COURT TERME DE DÉVELOPPER UN CANCER DU PULMON	RISQUE À LONG TERME DE DÉVELOPPER UN CANCER DU PULMON
Moins de 100 Bq/m³	1 %	10 %
100-200 Bq/m³	3,3 %	33 %
200-300 Bq/m³	7 %	77 %
300 Bq/m³ et plus	14 %	144 %

Vous avez testé votre maison : encouragez activement vos amis et votre famille à faire le même ! Les fournisseurs de détecteurs de radon peuvent être trouvés en ligne : takeactiononradon.ca/fr/detectage/professionnel-travaux-depistage-radon

Vous devez réduire la concentration de radon chez vous ?
Vous pouvez avoir droit à certains programmes de soutien financier pour vous aider. Pour plus d'informations au sujet des subventions et des garanties en matière de radon, visitez notre site Web : takeactiononradon.ca/fr/protage

COMMENT TROUVER UN PROFESSIONNEL CERTIFIÉ ?
takeactiononradon.ca/fr/protage/trad-a-radon-mitigation-professional

Systèmes d'atténuation du radon
Un système d'atténuation de radon est la méthode la plus efficace pour réduire les concentrations de radon. Les recherches montrent que les professionnels certifiés de radon sont en mesure de réduire les concentrations de radon de plus de 90 %. D'autres mesures, comme l'expansion de la ventilation et le scellage des fissures, peuvent être bénéfiques à court terme, mais sont moins efficaces.

Pour en savoir plus sur la réduction du radon :

Le Programme national de compétence sur le radon au Canada possède une liste de professionnels certifiés qui peuvent vous aider à réduire la concentration de radon dans votre maison. Pour en savoir plus sur la réduction du radon, visitez le : c-vep.ca/fr/trouver-un-professionnel

Pour obtenir de l'information auprès de Santé Canada, y compris le Guide de réduction du radon pour les Canadiens, visitez le : www.canada.ca/fr/sante-canada/verveas/jeune-santecanada/colle-jeune/vep-vep-publications/radon/radon-guide-reduction-canadienne-sante-canada.html

OCCUPE TOI DU RADON
takeactiononradon.ca/fr/


Ouvrez-vous le radon est une initiative nationale financée par Santé Canada pour aider à reconnaître les professionnels du domaine du radon et d'encourager la sensibilisation au radon partout au Canada. L'équipe de recherche est composée de l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon (ACTS) et de la Société canadienne du radon.

À l'heure qu'il est, chaque membre de la communauté devrait avoir reçu un rapport confidentiel individuel.

Détecteurs distribués	Sondages de départ complétés	Retournés	Rapports émis	Pourcentage de retour
64	46	46	45	70 %

2024-25 : 2 % > 200 Bq/m3

Résultats Ste-Barbe



41		Total	
0	0.0%	Supérieure à 1000	
0	0.0%	Entre 600 et 1000	
1	2.4%	Entre 200 et 600	
11	26.8%	Entre 100 et 200	
29	70.7%	Inférieure à 100	


Code postale	Nombre de résultats	Pourcentage supérieure à 200 Bq/m ³	Niveau moyen	Niveau plus élevé	Logements occupés par résidents habituels, 2016	Pourcentage des logements testés par le défi 100 trousse
JOS	36	3%	68.0	416.0	13758	0.26%

Données existantes pour la région de l'APQ

Dans ce secteur JOS, **155** demeures ont mesuré le radon. **18%** d'entre elles dépassent la directive nationale sur le radon (soit 200 Bq/m³). La concentration moyenne est de **148** Bq/m³, avec une concentration minimale enregistrée de **15** Bq/m³ et une concentration maximale enregistrée de **1436** Bq/m³.

Comment votre communauté se compare-t-elle ?

Pourcentage des maisons testées avec un niveau du radon supérieure à 200 Bq/m3 (Québec)



Duplicatas			
Communauté	Nombre de paires distribuées	Nombre de paires retournées	Nombre de paires séparées
Ste-Barbe	0	0	0

Genre d'habitations			
	< 200	> 200	Total
Maison détachée	15	3	18
Maison attachée	1	0	1
Maison mobile	2	0	2
			21


Propriétaires ou locataires			
	< 200	> 200	Total
Proprio	17	3	20
Locataire	2	0	2
			22

Avez-vous déjà testé ?			
	< 200	> 200	Total
Non	36	3	39
Oui	0	0	0
Oui, avec le défi 100 trousse	1	0	1
			40


Avez-vous un système de radon existant ?			
	< 200	> 200	Total
Je ne sais pas	8	0	8
Non	26	3	29
Point de départ	1	0	1
Système passif	0	0	0
Système actif	1	0	1
			39


Intention d'atténuer la maison (si besoin)			
	< 200	> 200	Total
Il est fort probable que je prenne des mesures pour réduire mon niveau de radon.	7	1	8
Il est probable que je prenne des mesures pour réduire mon niveau de radon.	14	0	14
Je suis indécis.	15	2	17
Il est peu probable que je prenne des mesures pour réduire mon niveau de radon.	1	0	1
			40

Résultats par année de construction - Ste-Barbe



PROCHAINES ÉTAPES - pour les participants :





Défi de 100 trousse de dépistage de radon

41
habitations

ont participé en effectuant des mesures de radon au cours de l'hiver 2024-2025 à l'aide de dosimètres Alpha Track de 91 jours. Cela représente environ de 7 % des habitations de la communauté.

2 %

des habitations ont mesuré au-dessus de la ligne directrice de Santé Canada de 200 Bq/m³.

- 🏠 Moins de 100 Bq/m³ (71 %)
- 🏠 100-200 Bq/m³ (27 %)
- 🏠 Plus de 200 Bq/m³ (2 %)



Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui provient du sol.



L'exposition à des concentrations élevées de radon entraîne un risque accru de développer un cancer du poumon.

Les concentrations peuvent varier entre les maisons voisines. La seule façon de connaître la concentration de radon est de la mesurer.

Le radon s'infiltre dans les maisons par le contact avec le sol et peut atteindre des concentrations élevées.



Lorsque vous recevez le rapport, prenez connaissance de la concentration de radon qui a été mesurée afin de pouvoir prendre une décision quant à la suite des choses.

La concentration de radon sera indiquée en Bq/m³. Il s'agit d'une mesure de radioactivité, car le radon est un gaz radioactif.



Si la concentration de radon mesurée est de moins de 200 Bq/m³, elle est conforme aux lignes directrices canadiennes. Envisagez de refaire un test dans 5 ans.



RÉDUISEZ LA CONCENTRATION : Lorsque la concentration de radon mesurée est égale ou supérieure à 200 Bq/m³, prenez des mesures pour la réduire au cours de l'année suivant la mesure.

La norme canadienne quant à la concentration maximale de radon dans l'air intérieur est de 200 Bq/m³.

Si vous avez effectué un dépistage dans votre maison et que la concentration de radon est égale ou supérieure à la ligne directrice canadienne de 200 Bq/m³, Santé Canada vous recommande de prendre des mesures pour la réduire.

Plus la concentration est élevée, plus les mesures d'atténuation doivent être prises rapidement pour la réduire au plus bas niveau possible. Bien que le risque pour la santé lié à une exposition à une concentration de radon inférieure à la directive canadienne soit faible, il n'existe pas de concentration qui soit considérée comme étant sans risque.

Il en revient à chaque propriétaire de maison de déterminer la concentration de radon qu'il est prêt à accepter.

CONCENTRATION DE RADON	RISQUE À VIE DE DÉVELOPPER UN CANCER DU POUMON	RISQUE À VIE DE DÉVELOPPER UN CANCER DU POUMON SI VOUS FUMEZ
Moins de 100 Bq/m ³	1 %	12 %
100-199 Bq/m ³	1,5 %	15 %
200-599 Bq/m ³	2 %	17 %
600 Bq/m ³ et plus	4 %	26 %

Vous avez testé votre maison ; encouragez maintenant vos amis et votre famille à faire de même ! Les fournisseurs de détecteurs de radon peuvent être trouvés en ligne : takeactiononradon.ca/fr/depistage/commander-trousse-depistage-radon

Vous devez réduire la concentration de radon chez vous ?

Vous pourriez avoir droit à certains programmes de soutien financier pour vous aider. Pour plus d'informations au sujet des subventions et des garanties en matière de radon, visitez notre site Web : takeactiononradon.ca/fr/protéger



Système d'atténuation du radon

Un système d'atténuation du radon est la méthode la plus efficace pour réduire les concentrations de radon. Les recherches montrent que les professionnels certifiés du radon sont en mesure de réduire les concentrations par plus de 90 %. D'autres mesures, comme l'optimisation de la ventilation et le colmatage des fissures, peuvent être bénéfiques à court terme, mais sont moins efficaces.

Pour en savoir plus sur la réduction du radon :

Le Programme national de compétence sur le radon au Canada possède une liste de professionnels certifiés qui pourront vous aider à réduire la concentration de radon dans votre maison.

Pour en savoir plus sur la réduction du radon, visitez le : c-nrpp.ca/fr/trouvez-un-professionnel

Les nouvelles maisons

Pour ceux qui construisent de nouvelles maisons, la norme CAN/CGSB-149.11-2019 de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) fournit des recommandations techniques et décrit les meilleures pratiques en matière de mesures de contrôle du radon dans les nouvelles habitations résidentielles basses.

Pour obtenir de l'information auprès de Santé Canada, y compris le Guide de réduction du radon pour les Canadiens, visitez le : www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/radon/guide-reduction-canadiens-sante-canada.html

OCCUPE TOI DU RADON
takeactiononradon.ca/fr

Occupe-toi du radon est une initiative nationale financée par Santé Canada ayant pour mandat de rassembler les intervenants du domaine du radon et d'accroître la sensibilisation au radon partout au Canada. L'équipe de consultation est composée de l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon (ACSTR) et de la Société canadienne du cancer.



Bourses d'atténuation :

Diverses municipalités du Québec - offrent une subvention de 500 \$ aux résidents dans le cadre de leurs programmes de subventions environnementales

Santé pulmonaire ▼ Qualité de l'air ▼ Tabagisme et vapotage ▼ Recherche pulmonaire ▼ Nouvelles ▼ Comment donner ▼

Accueil > Qualité de l'air > Radon > Lungs Matter: Radon Mitigation Support

LUNGS MATTER

Programme de subvention pour l'atténuation du radon

Le radon est la deuxième principale cause de cancer du poumon au Canada. Le radon peut



<https://www.poumon.ca/qualit%C3%A9-lair/radon/lungs-matter-programme-subvention-pour-l%E2%80%99att%C3%A9nuation-du-radon>

Crédit d'impôt pour les mesures du radon



Nous sommes heureux d'annoncer que les personnes travaillant à domicile peuvent désormais déduire les dépenses liées au dépistage du radon dans leur espace de travail !

Pour en savoir plus, consultez notre site Web www.carst.ca/HomeownerHealth#CRA



BREATHE
the lung association


Prochaines étapes : Programmes existants du Défi 100 trousse de dépistage

- Comment mieux établir un changement durable ?
- Travailler avec les communautés pour évaluer les options du monde réel :
 - Fournir à la communauté des détecteurs subventionnés
 - Financer les mesures d'atténuation
 - Mettre en place une campagne annuelle de sensibilisation

Les exemples d'action contre le radon dans Canada:

Au Canada, certaines mesures ont été entreprises par certains gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que d'autres institutions, notamment les suivantes: Exigences de réduction du radon dans les codes du bâtiment,

- Promotion de la sensibilisation au radon et du dépistage sur les sites web,
- Dépistage du radon dans les bâtiments publics : bureaux gouvernementaux, écoles, garderies et logements sociaux,
- Inclusion du radon dans les déclarations relatives aux biens immobiliers et conseils concernant les obligations professionnelles des agents immobiliers de traiter le radon comme un vice caché,
- Couverture de concentrations élevées de radon dans les demandes de garantie des logements neufs,
- Exigence d'atténuation du radon dans les propriétés locatives par certains tribunaux pour les litiges entre propriétaires et locataires; et,
- Clarification des directives relatives au radon sur le lieu de travail.




Guide d'action contre le RADON - Santé Canada

Le Programme national sur le radon de Santé Canada a élaboré des guides d'action sur le radon conçus pour aider les provinces, les territoires et les municipalités du Canada à élaborer des programmes et des politiques pour lutter contre le radon.

- décrire pourquoi l'action contre le radon est importante
- montrer quelles mesures les provinces, les territoires et les municipalités du Canada peuvent prendre
- fournir des exemples

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-et-risque-pour-sante/radiation/radon/guides-action/municipalites.html>

Guide d'action contre le radon à l'intention des municipalités:



- ☐ La planification relative au radon est bien établie dans de nombreux pays. Les municipalités peuvent commencer à mettre en place un grand nombre d'éléments fondamentaux caractérisant un plan d'action contre le radon, notamment:


Les principales caractéristiques d'un plan d'action sur le radon comprennent :

- ☐ Organiser des campagnes annuelles d'éducation et de sensibilisation du public pendant le mois de novembre, mois d'action contre le radon au Canada.
- ☐ Réaliser des tests au sein de la communauté afin de mieux connaître les niveaux de radon locaux.
- ☐ Adopter des objectifs de réduction de l'exposition au radon à l'intérieur de la communauté.
- ☐ Établir des règlements spécifiques et des politiques de fonctionnement concernant l'application du code du bâtiment, les logements locatifs, les bâtiments appartenant à la municipalité et les lieux accessibles au public.



Guide d'action contre le radon à l'intention des municipalités:

Les possibles d'action contre le radon et les mesures importantes qui peuvent être prises pour réduire le cancer du poumon induit par le radon dans les communautés.




La gestion des risques: C'est l'un des rôles des gouvernements que de protéger les individus contre les risques.

- ☐ Les municipalités sont des employeurs, des maîtres d'ouvrage et des exploitants de bâtiments, et parfois des propriétaires.
- ☐ Les municipalités sont également soumises à un devoir de diligence lors de l'inspection des bâtiments.
- ☐ Prendre conscience de la présence de radon et prendre des mesures afin d'y remédier constitue un bon moyen pour éviter d'être confronté à des litiges.



Guide d'action contre le radon à l'intention des municipalités:



Les pouvoirs d'agir à l'égard du radon dans le droit municipal: Municipalities have the legal authority to act on radon. Municipal legislation in most provinces identifies health and safety protection as part of a municipality's overall objectives or allows for the adoption of health by-laws

Les municipalités font appliquer des cadres juridiques qui constituent des éléments essentiels de la politique relative au radon, notamment :

- ☐ les codes du bâtiment
- ☐ les permis de construire
- ☐ les normes d'entretien des logements locatifs
- ☐ la qualité de l'air dans les espaces publics intérieurs (comme c'est actuellement le cas pour le tabagisme)



Merci pour votre participation à ce programme !

*www.occupetoiduradon.ca
@actiononradon*

